

Oiseaux des plaines agricoles des Hauts-de-France



Fauvette grisette
13 à 15 cm

Silhouette svelte, à queue assez longue, typique des Fauvettes

Bec assez long et fin



Linotte mélodieuse
12 à 14 cm

♂ tache rouge sur le front et la poitrine

♀ plus terne, légèrement striées sans rose

♂ des brun uni, tête grise

Silhouette rappellent le moineau ou le junco, mais en plus petite



Bruant proyer
16 à 19 cm

Silhouette d'un moineau mais plus grand avec corps plus impatant, tête paraissant plus grosse

bec fort, chair / jaunâtre

Pas de différence ♂♀



Bergeronnette printanière
15 à 16 cm

Gregaire, souvent en grands groupes

♀ plus pâle

Silhouette fine, élancée, longue queue



Bruant jaune
16 à 17 cm
Silhouette d'un moineau, en un peu plus grand

♂ des ailes striées

♂ tête jaune vif

♂ plumage à dominante jaune

♀ plus terne

♂ croupion brun-roux



Alouette des champs
16 à 18 cm
Silhouette trapue

petite huppe pouvant être rabattue

plumage brun-ocre piqueté de sombre

poitrine striée

ventre blanc

queue courte

Pas de différence ♂♀



Torier pâle
12 à 13 cm

♂ tête noire

♂ collier blanc

♂ des ombres légèrement rouge

queue relativement courte

♀ plus terne

Posture droite au sommet d'un perchot, nouveau



Corbeau freux
41 à 43 cm envergure 80 à 95 cm

Souvent confondu avec la Corneille

tête à dessus (calotte) bombée

bec droit, pointu, gris à base claire

Très ressemblant au Buzard Saint-Martin



Buzard cendré
40 à 50 cm envergure 95 à 115 cm

plumage gris

♂ une écharde brune sombre sur l'aile

♂ deux écharde brunes aigres noires dessous

♂ queue bruyante fine

♂ bout des ailes noir

♀ brune

♂ croupion blanc ou vif



Perdrix grise
28 à 37 cm

Très difficile à observer. S'entend (chant) plus que ne se voit

tache noire au milieu de la gorge

plumage brun-ocre clair marqué de sombre

queue très courte

Petite, ronde

face, gorge brun-orange

tache ventrale brun-sombre

Silhouette trapue au corps rond



Oedonème criard
38 à 45 cm

beige, crème strie de noir

♂ yeux et bec jaune

♂ bec jaune à bout noir

♂ bande alaire claire entourée de 2 bandes noires

♂ pattes hautes (= éliminées) jaunes

♂ court plus qu'il ne vole. Se déplace le corps à l'horizontale

♂ s'envole bruyamment, avec cris courts et ailes rapides et de brifs plans restant à faible hauteur

STOC : suivre l'évolution des populations d'oiseaux

STOC signifie **Suivi Temporel des Oiseaux Communs**. Depuis plus de 30 ans, ce programme permet d'évaluer l'évolution spatiale et temporelle des populations d'oiseaux communs année après année.

Il est coordonné par le Muséum, la LPO, et l'OFB. Depuis 2001, il s'appuie sur la réalisation d'un grand nombre de **points d'écoute**, répartis aléatoirement sur l'ensemble du territoire, permettant d'avoir une bonne représentativité des habitats, et des résultats généralisables à l'ensemble des populations nationales des espèces concernées.

Il mobilise chaque printemps de nombreux ornithologues bénévoles et professionnels qui réalisent partout en France, trois sessions d'**inventaire**, espacées de 4 semaines, sur environ 1000 carrés de 4 km², avec à chaque fois 10 points de comptage de 5 minutes chacun répartis sur ces carrés. Ce sont donc environ 20.000 points d'écoute qui sont réalisés chaque année !

D'autres suivis, plus localisés (plaine de Sèvre...), ou plus spécifiques sur certaines espèces (Perdrix et Caille par l'OFB...) apportent également des informations sur l'**évolution des populations**... avec des résultats qui convergent.



Jeunes busards des roseaux au nid

Busards des roseaux (mâle)

Busards : au chevet de leurs nichées

Les **busards** (cendrés, saint-martin ou des roseaux) sont des espèces originellement liées aux **milieux ouverts** tels que les landes et les zones humides (roselières...). A l'instar d'autres espèces, ils se sont installés dans les plaines agricoles suite à la réduction de leurs habitats naturels initiaux et par opportunité d'y trouver des conditions de milieux assez semblables.

Cependant, la **nidification** ayant lieu au sol, en plein champ, les nichées sont très exposées au risque d'être détruites par les moissons. L'évolution du climat, permettant des moissons souvent de plus en plus précoces, augmentent ce risque et la nécessité d'intervenir.

Des **actions** sont ainsi réalisées partout en France, chaque année, pour permettre aux busards de mener à bien leur reproduction. Cela nécessite la localisation des nids par suivi visuel régulier ou par utilisation de drone, puis, selon les besoins, du marquage de l'emplacement du nid pour évitement lors de la moisson, ou du déplacement du nid dans une parcelle voisine.


Des populations en chute libre !!!

3 espèces sur 4 d'oiseaux des plaines cultivées sont en régression ! En moins de 20 ans, 1/3 des oiseaux ont disparu de nos campagnes !

- 53 % pour le Bruant jaune !
- 43 % pour la Perdrix grise !
- 39 % pour la Caille des blés !
- 22 % pour l'Alouette des champs !

Nos oiseaux des plaines agricoles se portent très mal !!! Très peu d'espèces tirent leur épingle du jeu... La faute à qui ? À quoi ?

Evolution des indicateurs par groupe de spécialisation



Oiseaux des plaines agricoles des Hauts-de-France



Alouette des champs

Bruant jaune

Des auxiliaires de cultures

Les oiseaux des plaines peuvent être de bons auxiliaires des cultures, participant au **contrôle** des populations d'insectes, de mollusques et de micromammifères dans les parcelles. En effet, en se nourrissant, ils consomment quotidiennement d'autres espèces considérées comme "nuisibles" pour les cultures, permettant le maintien d'un équilibre, et contribuant ainsi à éviter ou limiter l'usage de pesticides. Les oiseaux granivores, quant à eux, participent au contrôle des plantes adventices, en en consommant les graines.

Menu saisonnier

Comme pour de nombreuses espèces, le **régime alimentaire** de l'Alouette varie au cours de l'année. Essentiellement végétal en automne-hiver (graines et jeunes pousses), il devient principalement insectivore en période de reproduction. Larves et adultes d'insectes, vers de terre et petits mollusques, composent alors les repas des adultes et des poussins.

L'impact des pesticides

Au cours du XX^{ème} siècle s'est développée la **chimisation de l'agriculture**, marquée en particulier par le développement de l'utilisation des **pesticides** et des **engrais de synthèse**. Celle-ci a provoqué une **chute** de la quantité d'insectes présents en milieux cultivés, et par répercussion, de celle de leurs prédateurs, dont les oiseaux insectivores.

L'usage des **herbicides** pour la lutte contre les plantes adventices des cultures ont eu pour leur part aussi un impact sur les populations d'oiseaux granivores, diminuant la quantité et appauvrissant la diversité des **graines** disponibles.

L'uniformisation des paysages, la disparition des éléments fixes...

Les **éléments fixes du paysage** (haies, arbres isolés, talus, bords de chemin enherbés...) constituent des composantes essentielles du territoire de beaucoup d'espèces, et en sont même souvent au cœur !

En période de reproduction, les mâles chanteurs de nombreuses espèces (Bruants, Tarier père, Fauvette grisette...) utilisent les arbres et arbustes comme postes de chant pour que le son porte loin et qu'ils soient plus visibles.

Les **haies et fourrés** sont également nécessaires à la nidification de certaines (Fauvettes, Hypolaïs, Linotte...) ; ils offrent un refuge à d'autres (Perdrix...). Ils constituent aussi une ressource alimentaire essentielle, par leur production d'insectes, de graines et de fruits.

L'**uniformisation des paysages agricoles**, avec la disparition des éléments fixes, au profit de parcelles de plus en plus grandes et homogènes, engendre un appauvrissement des cortèges d'oiseaux, ne permettant plus la présence que de quelques espèces inféodées aux milieux les plus ouverts, voir steppiques.

Certaines **politiques agricoles**, telle que la création puis de remise en culture de jachères, ont été tour à tour en faveur puis en défaveur des oiseaux de nos plaines.



Avec le soutien financier de :



Conception : CPIE du Cotentin BP 42 - 30 rue de l'hippodrome 50430 LESSAY
Tél. : 02 33 46 37 06 / Site : cpiecotentin.com
Maquettes et illustrations : © Céline Lecoq / CPIE du Cotentin
Crédits photos : Lilian Sineux, Céline Lecoq, Henry Lucas de Lesterville, Bertrand Saignes, Damien Top, Guy Louvion, Fabrice Cochin, Benoit Danten, Nicolas Richard, Vincent Aclouque
Textes : Guénael Hallart, Perrine Brice, Chloé Jacquet